


GHID DE LUCRU^{1,4} PRIVIND MANAGEMENTUL ȘOCULUI ANAFILACTIC ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ (MG/ STOMA)



PAȘI EFECTUAȚI PROMPT ȘI SIMULTAN

<p>1. Probleme care pun viața în pericol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Căi respiratorii: Răgușeală, stridor, disfagie, tahipnee • Respirație: Wheezing, efort respirator, oboseală, cianoză, SpO₂ < 94% • Circulație: TA scăzută, semne de șoc, modificarea stării de conștiență 	<p>2. Administrarea Adrenalinei intramusculară⁵: Se utilizează stilou preumplut³ sau în lipsă, Adrenalină fiolă 1mg/ml nediluată trasă într-o seringă de 1ml, cu diviziuni din 0,1 în 0,1ml) și se administrează după cum urmează:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Copil < 25-30 kg:</td> <td style="width: 50%;">0,15 miligrame IM (0,15 ml) i.m.^{2, 5}</td> </tr> <tr> <td>Adult/Copil ≥ 25-30kg:</td> <td>0,3 miligrame IM (0,3 ml) i.m.^{2, 5}</td> </tr> </table> <p>3. Salbutamol: Adult și școlari: 6 puff-uri (600 micrograme - cu repetare la nevoie) Preșcolari: 4 puff-uri (400 micrograme - cu repetare la nevoie)</p> <p>4. Desloratadină (sol.orală / comprimat) numai dacă înghițirea este posibilă: < 12 ani - 2,5 mg ; > 12 ani - 5 mg</p>	Copil < 25-30 kg:	0,15 miligrame IM (0,15 ml) i.m. ^{2, 5}	Adult/Copil ≥ 25-30kg:	0,3 miligrame IM (0,3 ml) i.m. ^{2, 5}	<p>5. Dacă este posibil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montarea unei linii venoase periferice; • Administrarea intravenoasă de fluide: - Ser Fiziologic <p>Adulti/Copii > 25-30 kg: 500ml bolus (repetat la nevoie) Copii < 25-30 kg: 10ml/kg (max. 500ml)</p>
Copil < 25-30 kg:	0,15 miligrame IM (0,15 ml) i.m. ^{2, 5}					
Adult/Copil ≥ 25-30kg:	0,3 miligrame IM (0,3 ml) i.m. ^{2, 5}					

¹ Conform EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update) [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15032] și AREA (Asociația Română de Educație în Alergii) - Plan de acțiune în anafilaxie [RO];
² Administrarea ADRENALINĂ intramuscular - se injectează în treimea mijlocie a coapsei (regiunea anterolaterală) cu ace adecvate ca mărime pentru administrarea intramusculară;
³ Pentru o administrare facilă pot fi utilizate stilourile preumplute cu adrenalină, disponibile în variantele de 0,15mg sau 0,3 mg/doză unică;
⁴ Ghidul are caracter informativ și nu substituie consultația, diagnosticul și decizia medicală;
⁵ Ace pentru injecțiile intramusculare 21G (verde), 22G (negru), 23G (albastru), în funcție de grosimea țesutului adipos.
⁶ https://cprguidelines.eu/